

2020



**CONSEJO  
DENTISTAS**  
ORGANIZACIÓN COLEGIAL  
DE DENTISTAS  
DE ESPAÑA

# **TERCERA ENCUESTA SOBRE LA COVID-19 EN LOS DENTISTAS ESPAÑOLES**

15 septiembre 2020

## Introducción:

Ante la situación creada por la COVID-19, el Consejo General de Dentistas de España junto a la Sociedad Española de Salud Pública Oral (SESPO), realizaron una amplia encuesta dirigida a dentistas españoles entre los días 6-12 de abril del 2020 con el objetivo de conocer varios aspectos de relevancia de su situación laboral y personal en pleno momento de pandemia. Esta encuesta se repitió una vez iniciado el periodo de desescalada y la progresiva normalización de la actividad clínica a partir del 11 de mayo, introduciendo aspectos novedosos. Una vez transcurridos cerca de 4 meses desde el segundo estudio, el Consejo General de Dentistas de España ha considerado oportuno llevar a cabo una tercera encuesta, esta vez con un cuestionario reducido enfocado a preguntas muy específicas, centradas en el periodo 15 mayo-septiembre 2020.

## Metodología de la encuesta:

- **Tipo de encuesta:** encuesta de autorelleno online, con acceso libre a todos los dentistas de España
- **Tipo de estudio:** cuantitativo descriptivo
- **Universo de análisis:** conjunto de dentistas de España
- **Fecha de campo:** la recogida de datos se ha realizado entre los días 1-14 de septiembre del 2020

## Resultados de la encuesta:

### Los datos sociodemográficos


La muestra está constituida por 2.208 dentistas participantes, con una edad media de 43,3 años, siendo el 62% mujeres. En cuanto a la distribución de la muestra por grandes áreas geográficas, de las 6 áreas contempladas la muestra se encuentra ligeramente infraestimada en la zona Noreste (Cataluña, Baleares y Aragón) y sobreestimada en la zona Sur (Andalucía, Extremadura y Canarias). Sin embargo, de manera global, se puede asegurar un reparto de los encuestados, proporcional al reparto geográfico del universo de dentistas.

Con relación a la edad media de los participantes, es muy similar a la del universo (41 años). Lo mismo ocurre con el reparto del género, superponible al universo (60% de dentistas españoles son mujeres).

## La encuesta

### ¿Cuál es el funcionamiento de la clínica en la que ejerce?

En el momento de la encuesta, el **91%** se ha incorporado a su ejercicio habitual sin ninguna limitación de actividad, un **7%** no realiza actividades aerolizantes, y un **1%** solo atiende a urgencias. Es de señalar que el **0.5%** no ha reanudado aún su actividad y otro **0.5%** ha clausurado definitivamente su clínica.




### ¿Desde mediados de mayo ha tenido que recurrir a un ERTE?

De los 2.208 encuestados, 116 (5%) no respondieron a esta pregunta. El **27.5%** ha tenido que recurrir a un ERTE a partir de mediados de mayo.


### ¿Qué grado de utilización realiza de los protocolos recomendados por la Organización colegial?

Globalmente en una escala comprendida entre 1 (nula utilización) y 5 (utilización plena) con relación a la utilización de los protocolos recomendados, la media es de 4.5 (máximo 5). El **93%** afirma realizar una utilización total o casi total de los mismos. En el otro extremo, el **1%** no los utiliza.



### Realización de PCR

De los 2.208 encuestados entre mediados de mayo y septiembre del 2020, 741 (**33.5%**) se han realizado una PCR. De ellos, en 30 casos dio positiva (4%), en 12 casos la sospecha del contagio ha sido en el ámbito laboral (1.6%) y en los 18 casos restantes con sospecha de contagio en el ámbito privado no laboral (2.4%).



## Conclusiones del estudio

1. 9 de cada 10 dentistas ha reanudado su actividad clínica sin ninguna limitación.
2. 3 de cada 10 dentistas ha tenido que continuar recurriendo a un ERTE durante el periodo analizado de mitad de mayo a septiembre.
3. El grado de utilización de los protocolos recomendados por la Organización Colegial es muy elevado: el 93% de los encuestados los utiliza en su totalidad.
4. 1 de cada 3 encuestados se ha realizado una PCR durante el periodo de estudio, dando positiva en el 4% de los casos.